

## צניחת עפעף (פטוזיס Ptosis)

פטוזיס הינו צניחה של העפעף העליון שלא כתוצאה מעור עודף. צניחת העפעף העליון יכולה להיות קלה וקוסמטית בלבד, אך היא עלולה לכסות את האישון ולגרום הפרעה בראייה. כתוצאה מצניחת העפעף מנסה האדם להרים את העפעף הצנוח ע"י הפעלת שרירי המצח ו/או ע"י הטיית הראש לאחור, מצבים המביאים לכאבי שרירים וכאבי צוואר.

מבחינים בין צניחת עפעף מולדת וצניחת עפעף נרכשת.



צניחת עפעף נרכשת



צניחת עפעף מולדת

צניחת עפעף מולדת מופיעה בד"כ מיד אחרי הלידה. היא עלולה להופיע בעין אחת או בשתי העיניים. במידה והצניחה קלה ומהווה פגם קוסמטי בלבד, מומלץ לבצע ניתוח מתקן בסביבות גיל 5 שנים. במידה והצניחה קשה והעפעף מכסה את האישון, יש צורך לבצע ניתוח לתיקון הצניחה בגיל מוקדם על מנת למנוע התפתחות עין עצלה.

צניחת עפעף נרכשת מתפתחת בגיל מבוגר יותר. היא נובעת ממספר סיבות כגון שיתוק עצבי, ניוון שרירים, חבלה ושינויים הקשורים לגיל. הסוג השכיח יותר הוא זה הקשור לגיל והוא נובע מהחלשות הקשר בין השריר שמרים את העפעף לבין העפעף.

תיקון צניחת עפעף יכול להתבצע ע"י ניתוח בלבד. הניתוח מבוצע בהרדמה כללית במקרה של ילדים ובהרדמה מקומית במקרה של מבוגרים. במהלך הניתוח מחזק רופא העיניים את החיבור שבין השריר לעפעף. אחוזי ההצלחה בניתוח זה הינם גבוהים.

דף מידע זה נועד לספק מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לבדיקה וייעוץ של רופא עיניים.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל פנייה ושאלה.

צוות מחלקת עיניים.

טלפון להתקשרות 08-6745722.